

ГБУЗ М
ОТДЕЛЕНИЕ ФУНД

Тип ап
ЭХОКАРДИОГРА

Ф.И.О. Середина Е.А., возраст 39

Аорта: уплотнена, корень аорты 3.6

Аортальный клапан: створки уплотн
см.(N>1.5)

Левое предсердие: диаметр 3.1 (N до

Левый желудочек: Размеры: МЖП
(N до 1,1 см), КДР 4.6 (N до 5,5 см), К

Объемы по методу Teicholtz: КДО 97
УО 67 (N до 90 мл), ФВ 69 (N более 5

Нарушения локальной сократимост

Митральный клапан: створки уплот
митрального кольца.

Митрально-септальная сепарация 0.4

Правое предсердие: площадь 11 (N ≤

Правый желудочек: 2.3 (ПЗР<3см),

Нижняя полая вена: диаметр 1.3 см.

СисДЛА: 26 мм рт.ст. (N<30)

СДЛА 16 мм рт.ст. (N<20)



Допплерэхокардиография: патологи
трикуспидальная регургитация 0-1 ст.

Перикард: без особенностей

Диастолическая функция: E/A= 1.3'

Нарушена: 1ст-нарушение расслаблен
рестрикция, 4ст-стойкая рестрикция.

Индекс ТЕІ н/о (индекс глобал



Комментарий: исследование на фоне

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Уплотнение створок аортального клапана. Трикуспидальная недостаточность 0-1 ст. (физиологическая), недостаточность клапана легочной артерии 1 ст. Нарушения локальной сократимости: не выявлены, экскурсия миокарда сохранена. Глобальная сократимость не нарушена. Диастолическая функция не нарушена. Данных за легочную гипертензию нет. Фракция выброса в пределах нормы.

Дефект межпредсердной перегородки. При пробе Вальсальвы – до 10 мм, регистрация низкоскоростного сброса из правого предсердия в левое.

Врач: Коробкин М.В.

ГБУЗ МО
ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЭХОКАРДИОГРАФИИ

Тип аппарата

ЭХОКАРДИОГРАФИЯ

Ф.И.О. Середина Е.А., возраст 39 лет

Аорта: уплотнена, корень аорты 3.6

Аортальный клапан: створки уплотнены, регургитация 1 ст. (N>1.5)

Левое предсердие: диаметр 3.1 (N до 4.0)

Левый желудочек: Размеры: МЖП в сечении 1.1 (N до 1.1 см), КДР 4.6 (N до 5.5 см), КСО 150 (N до 160 мл)

Объемы по методу Teicholtz: КДО 97 (N до 100 мл), КСО 150 (N до 160 мл), ФВ 69 (N более 55%)

Нарушения локальной сократимости: не выявлены

Митральный клапан: створки уплотнены, регургитация 1 ст.

Митральное кольцо: диаметр 3.8 (N до 3.8 см), площадь 11 (N до 11 см²)

Митрально-септальная сепарация: 0.4 (N до 0.4 см)

Правое предсердие: площадь 11 (N до 11 см²)

Правый желудочек: 2.3 (ПЗР<3 см), устье 1.1 (N до 1.1 см)

Нижняя полая вена: диаметр 1.3 см., устье 1.1 (N до 1.1 см)

СисДЛА: 26 мм рт.ст. (N<30)

СДЛА: 16 мм рт.ст. (N<20)

Допплерэхокардиография: патологии не выявлены



Трикуспидальная регургитация: 0-1 ст.

Перикард: без особенностей

Диастолическая функция: E/A= 1.37 (N до 1.37)

Нарушения: 1 ст-нарушение расслабления, 4 ст-стойкая рестрикция.

Индекс ТЕИ: н/о (индекс глобал)



Комментарий: исследование на фоне тахикардии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Уплотнение створок аортального клапана. Трикуспидальная недостаточность 0-1 ст. (физиологическая), недостаточность клапана легочной артерии 1 ст. Нарушения локальной сократимости: не выявлены, экскурсия миокарда сохранена. Глобальная сократимость не нарушена. Диастолическая функция не нарушена. Данных за легочную гипертензию нет. Фракция выброса в пределах нормы.

Дефект межпредсердной перегородки. При пробе Вальсальвы – до 10 мм, регистрация низкоскоростного сброса из правого предсердия в левое.

Врач: Коробкин М.В.

ГБУЗ МО БАЛАШИХА «ЦРБ»
ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Тип аппарата "VIVID 7 PRO"
ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Ф.И.О. Середина Е.А., возраст 39 лет, дата исследования 29.01.2016 г.

Аорта: уплотнена, корень аорты 3.6 (N до 3,7),

Аортальный клапан: створки уплотнены, утолщены, кальцинированы, ампл. раск-я 1.8 см. (N>1.5)

Левое предсердие: диаметр 3.1 (N до 4,0 см), КСО 23 мл.

Левый желудочек: Размеры: МЖП в диастолу 1.1 см (N до 1,1 см), ЗС в диастолу 0.9 см (N до 1,1 см), КДР 4.6 (N до 5,5 см), КСР 2.8 (N до 3,8 см).

Объемы по методу Teicholtz: КДО 97 (N до 147 мл), КСО 29 (N до 58 мл),

УО 67 (N до 90 мл), ФВ 69 (N более 55%)

Нарушения локальной сократимости: не выявлены, экскурсия миокарда сохранена.

Митральный клапан: створки уплотнены, кальцинированы, утолщены, кальциноз митрального кольца.

Митрально-септальная сепарация 0.4 (N до 1 см)

Правое предсердие: площадь 11 ($N \leq 18 \text{ см}^2$), КСО 21 мл

Правый желудочек: 2.3 (ПЗР<3 см), увеличен, толщ. своб. стенки 0.5 (N до 0,5 см)

Нижняя полая вена: диаметр 1.3 см., коллабирование на вдохе > (N выше 50%)

СисДЛА: 26 мм рт.ст. (N<30)

СДЛА 16 мм рт.ст. (N<20)

Допплерэхокардиография: патологические турбулентные потоки в полости сердца

трикуспидальная регургитация 0-1 ст. (физиол.), легочная регургитация 0-1 ст.

Перикард: без особенностей

Диастолическая функция: E/A= 1.37 (N 0.75-1.5) E/e=10 (N<8)

Нарушена: 1ст-нарушение расслабления, 2ст-псевдонормализация, 3ст-обратимая рестрикция, 4ст-стойкая рестрикция.

Индекс ТЕІ н/о (индекс глобальной функции ЛЖ N<0,49)

Комментарий: исследование на фоне тахикардии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Уплотнение створок аортального клапана. Трикуспидальная недостаточность 0-1 ст. (физиологическая), недостаточность клапана легочной артерии 1 ст. Нарушения локальной сократимости: не выявлены, экскурсия миокарда сохранена. Глобальная сократимость не нарушена. Диастолическая функция не нарушена. Данных за легочную гипертензию нет. Фракция выброса в пределах нормы.

Дефект межпредсердной перегородки. При пробе Вальсальвы – до 10 мм, регистрация низкоскоростного сброса из правого предсердия в левое.

Врач: Коробкин М.В.

