

Трансторакальная эхокардиография.

Пациент Новодворская В., 2007 г. Дата 12/V 2010г


Рост _____ см Вес _____ кг АД _____ мм.рт.ст.

АО	<u>17</u>	мм	ЛЖ	<u>38</u>	мм	КДО ЛЖ	<u>64</u>	мл
ЛП	<u>29</u>	мм	ЛП	<u>27 мл</u>	мм	КСО ЛЖ	<u>79</u>	мл
КДР	_____	мм	ПЖ	<u>32</u>	мм	УО ЛЖ	<u>250</u>	мл
КСР	_____	мм	ПП	<u>32 мл</u>	мм	ФВ ЛЖ	<u>58</u>	%
МЖП	<u>6</u>	мм	ЛА	<u>21</u>	мм	МОС	_____	л/мин
ЗСЛЖ	<u>6</u>	мм	НПВ	_____	мм	СДПЖ	_____	


Зоны региональной асинергии миокарда левого желудочка в покое:




Дискинез




Акинез



Гипокинез



Нормокинез



Заключение:

В ПС. Переструктурированный перимембранозный дефект передней стенки ЛЖ, с несравнимым сросом (д 22 мм). Максимальный межжелудочковый градиент 20 мм рт.ст. Диаметр левых отделов сердца. Отношение легочного кровотока к системному 2,0-2,5. Легкая митральная регургитация (до 1/3 диаметра митральной створки). ФЛЖ 6 мм рт.ст. Диаметр ствола легочной артерии ФЛЖ 60 мм рт.ст. - 65 мм рт.ст. Гипертрофия миокарда ПЖ (толщина свободной стенки 6 мм).

